

SCHEMAS VACCINAUX

Mise à jour : 24/10/2022



	SCHEMA INITIAL		RAPPEL IMMUNOCOMPETENTS	RAPPEL SI IMMUNODEPRESSION (sur avis médical*)
	1 ^{ère} dose	2 ^{ème} dose (21 jours après la 1 ^{ère} dose)	Dose de rappel 6 mois après la 2 ^{ème} dose OU après le dernier rappel OU après la dernière infection	Dose de rappel 3 mois après la 2 ^{ème} dose OU après le dernier rappel OU après la dernière infection
5-11 ans	COMIRNATY [®] pédiatrique 10µg	COMIRNATY [®] pédiatrique 10µg	COMIRNATY [®] pédiatrique 10µg	Sur avis médical
12-17 ans	COMIRNATY [®] 30µg	COMIRNATY [®] 30µg	COMIRNATY [®] bivalent	COMIRNATY [®] bivalent
18-59 ans POPULATIONS PRIORITAIRES Personnes vivant dans entourage de personnes immunodéprimées ou vulnérables Personnes en situation d'obésité (IMC > 40) Femmes enceintes quel que soit le terme Professionnels de santé Professionnels navigants (aérien et maritime) Agents touristiques accompagnant des groupes Personnes en longue maladie POPULATIONS NON PRIORITAIRES Population Générale	COMIRNATY [®] 30 µg	COMIRNATY [®] 30 µg OU NUVAXOVID [®] 0.5 mL	COMIRNATY [®] bivalent	COMIRNATY [®] bivalent
	NUVAXOVID [®] 0.5 mL	NUVAXOVID [®] 0.5 mL		
60 ans et plus (si immunodéprimés voire colonnes finales)	COMIRNATY [®] 30 µg	COMIRNATY [®] 30 µg OU NUVAXOVID [®] 0.5 mL	COMIRNATY [®] bivalent	COMIRNATY [®] bivalent
	NUVAXOVID [®] 0.5 mL	NUVAXOVID [®] 0.5 mL		
80 ans et plus (Considérer dans tous les cas la colonne « immunodéprimés »)	COMIRNATY [®] 30 µg	COMIRNATY [®] 30 µg OU NUVAXOVID [®] 0.5 mL	➔	COMIRNATY [®] bivalent
	NUVAXOVID [®] 0.5 mL	NUVAXOVID [®] 0.5 mL		

REMARQUES :

*Les personnes immunodéprimées sont les personnes suivantes : transplantés d'organes solides, transplantés récents de moelle osseuse, patients dialysés, patients atteints de maladies auto-immunes sous traitement immunosuppresseur agressif de type anti-CD20 ou anti-métabolites, patients atteints de certains types de lymphomes traités par anti-CD20 ou inhibiteurs de BTK, patients atteints de leucémie lymphoïde chronique, patients atteints de formes rares de déficits immunitaires primitifs, et myélomes sous traitement.

1 infection Covid survenue plus de 15 jours avant le début de la vaccination ou après la réalisation d'une injection, vaut l'équivalent d'une injection pour le schéma initial

1 infection survenue moins de 15 jours après une injection ne compte pas dans le calcul du nombre de doses

En cas de voyage à l'étranger, tous les pays n'appliquent pas le principe "1 infection = 1 injection". L'utilisateur doit justifier d'un schéma vaccinal initial complet (2 doses) +/- une dose de rappel